


! " # \$ % & ' () * +



径 所列 均 到 方 格 型 异 ！
®

			后	密切				征	
			查						
			拮				儿	少	出
巴				命				巴	
一		型	巴	后	例			拮	
			例						例
	克	恩					少		几乎
所			断	断	接受	唑嘌	疏基嘌		合
拮			尚	定		否		拮	拮
				关					

【 名 】

名
商 名[®]
文名
拼

【 份】

分
克
分
料 枸橼 枸橼 二 合 二 化 山梨 山梨

【 】

无

【 】

关
合 于
• 善 情 效 佳
关

合 以减 关 损伤 显

以 善 机

强 柱

于 效 佳 强 柱

屑

于 斑块 屑

于 充分

合 后

只 予将会 密切 定

【 格】

【 】

具 关 断 专 控

建 向合 专 咨

于 当 必 接受

技术培 后 以

于 林 令抽取所 每个

林 实 以 保 抽

于 含 必 查无 技术 抽取及排气

以保

带 一次 器 查一次 无 器

否完整 完整 勿 ； 从 处打 将

一半后取出 头 安 于 器 头 方向旋 半圈以 定

头于 座 ； 拔出 头护套 尖损伤 器抽取 林 内容

次 完毕后 器一 丢弃到 宜容器

抽取 将 室温放 分 抽取 查

无 变 变 则 含

因 将 器 剩余 未 丢弃
大 每次 择 位 疼痛
淤 瘢痕 妊娠 区域 屑 任
何凸 厚 屑斑块 变区域
合 例
优化

人
关
于 关 人 建 每两周

以 杨 留
痛 关 以 善 情 合
情况 【 事 】 分
一 出 效 以将
每周 以 善 效
周内 内未出
慎 否

断
手术 断
天 更 后再次 会 到
断 安

强 柱
于 强 柱 人 建 每两周
周内 内未出
慎 否

屑
于 屑 人 建 次 然后
次 后一周 每两周
周内未出 慎 否

充分 每周 来
率 后 于 仍 充分 当 每周一
次 【 分 因 率
充分 则后 减少 每两周
尚未 于 斑块 屑
一 安 效 估

接受 推 方案 次 然后
次 后一周 每两周
后 周 根 实 步减少
建 每 受 估
根 具 会提供 格

殊人

无 整
/ 功
未 人 尚无 建
【 反 】

以 反 主 来
名 个 更 关 放
关 幼 关 关
型幼 关 点 关 关 以及 型 柱关 强
柱 放 学 型 柱关 屑 关 克 恩
屑 化 汗 关 含 接受
名 以及 段接受安慰
名

关 双盲 段 于 事
断 比例
安 总
最 反 比 咽 呼吸
位反 斑 瘙痒 出 疼痛 头痛 疼痛
会影响人 影响人 于 内 拮
也 一 例 引 威 命 御功
机会 乙型 以及 白 巴
巴
也 反 反 反 反
减少 再 枢 周 事
狼疮 狼疮 关 史 文 合征

反
按 人 器官分 率 十分 ; ;
偶 ; < ; 无 根 估
列出 后 反
以 按 率划分 各 反 根 呈 序排列
各个 察到 最 率 反 人 器官分 栏 星号
更 关信息 【 忌】【 事 】 【 反 】

反

人 器官分	率	反		
	十分	呼吸	呼吸	咽
		咽 疱疹		
				流 冒
*		沟	疱 坏	带 疱疹
		口	疱疹	

人 器官分	率	反
	偶	殖 孟 关 机会 分枝 合 憩室 ¹⁾
息 及 囊 *	偶 未	以 癌 基底 癌 癌 巴 ** 实 器官 ** 乳 癌 白 ¹⁾ T 巴 ¹⁾ 克尔 癌 内分泌癌 ¹⁾
巴 *	十分 偶	白 减少 减少 乏 白 小板减少 小板减少 癥 减少
*	偶	敏反 敏 季 敏 ¹⁾ 敏反 ¹⁾
! " # \$	十分	% & ' (尿 & 异 ') ,
*		情 + 变化 , - . /
*	十分	头痛

人 器官分	率	反
	偶	0 异 0 减 1 2 头痛 根 3 4 1) 5 6 变 化 例 7 格林-巴 8 合征 1)
器官	偶	7 0 损 9 : 7
及 ;	偶	< = > ?
@ A 器官 *	偶	@ @ B 1) @ C D 充 @ E F G @ A H
	偶	3 I 主 J J K L M N J
呼吸 O P Q *	偶	R S 呼吸 T U V W M L 1) X L O 1) Y Z 化 1) 痛 @ [\ 出] 化 ^ 反流 _ ` 合征 偶 a b 咽 T U c

人 器官分	率	反
	未	F G ^r
	十分	疹 j 疹 屑 屑 化 k l 疱型 屑 ¹⁾ m n 疹 o 疹 p 断 汗 ¹⁾ 瘙痒 偶 q 汗 瘢痕 r 斑 ¹⁾ 史 文 - 合征 ¹⁾ ¹⁾ ¹⁾ s t u 反 ¹⁾ 未 化 ¹⁾
v 及	十分	疼痛 w x g & 偶 y z { 斑狼疮 狼疮 合征 ¹⁾
A 泌尿		损 9 尿 偶 尿
殖 乳 异	偶	} 功
反 * 位各	十分	位反 位 斑 偶 O 痛 ~ ¹⁾
实 室 查*		• 出 化 分 • g € 查 双 • DNA 乳  g &
损伤 手术		, 合

更 信息 【 忌】 【 事 】 【 反 】

放 f

每两周
安 征 安 征

反 „ ...

位反

人关 接受
出 位反 瘙痒 出 疼痛 接受安慰
...反 † 一 ‡ ^ 无 因 位反 ‰

人关 接受 率
接受安慰 主
咽 呼吸 以及尿 以及 Š 大 < ,
后 接受
接受 率
安慰 比率
放 例 命 Œ • 少
ž 以及 机会 例

Š 大 后 • 个 以反 •
出 征

昇 巴

关 段 关 强
柱 放 学 型 柱关 屑 关 屑 化
汗 克 恩 名 巴 周
接受 名 癌
率 信区 名
信区 位
个 位 个

癌 率 信区
信区 ... 癌 信区
癌 率 信区
巴 率 信区
将 分 完 放 f 合 后
位 察 名 ‘ 所 察
到 巴 癌以 变 率
癌 率大 巴 大
后 主 关
率 所 癌
巴 率大 分 ‘ 【 事
】 分
后 关于 巴 反 【 事 】
分
——
r “ 以及 效E 关
反 未 显 关
关 个 内
点 关 接受 名
名 到 比 安慰
合 ‘ 比例 ；
合 比例
强 柱 接受
出率 合 率
则
屑 接受
出率
” 再 从 斑块 屑

再 后 出率

接受

出
于 分•具 - 异 因 宜将 出 比例 -
比—

关 个 点 “ u
基 周后 ~ 定
接受 接受安慰 比例分’
所 接受 关 屑 关 名
名 出 狼疮 u 合征 断 % 后
到 善 无 狼疮 出 枢

f 事

关 屑 关
周 周 接受 & 率
率
斑块 屑 周 周
接受 & 率
率

人 周 ™ 周 次 予
; ™ 周 每两周 接受
位 š ˋ 天 分’ 天 天 接受
接受 出 & œ
所 & š 大 例 &
一 以 后 { 然 后 接受
功 F G 以及少 功 F G 例

• 唑 嘌 /6- 嘌 合

人克 恩 • 唑 嘌 嘌 合 察到

关 事 率 于 ž

内 斑块 屑 例 接受
反 情况

反

器官分	率	反
及	十分 偶	呼吸咽 尿 i ¢ 囊 £ t 口 疹 牙 疱
f	十分	g & f □
！ " 及 # \$	偶	尿 % ' ¥ 白 □
及	偶	疹 m n 疹 瘙痒 变 点□
及 巴	偶	巴 白 减少 白 巴 小板 □
呼吸 O 及 P	偶	口咽 v w § ÿ “ 大 块□ □
各 查	偶	尿 带 分枝 合 @ © ^ 异
各 v 及	偶	疼痛 关 « □

器官分	率	反
及 位各反	偶	位反 ~ α
@A器官	偶	@ 室 ¬ - @ @ ®@室 “大α
各	偶	头痛 - B 头=
殖及乳	偶	出
	偶	° 口 [\
及 囊息	偶	乳头
内分泌	偶	± ²
巴	偶	3
器官	偶	白内

【忌】
于分敏【份】分
3 机会【
事】分
到 @EFG分μ【事】分
【事】
拮更¶功受损

及 后 必 密 否出
于 “ 个 因
无 · , 未 到控 均
š › 史 ¹ 方
¹ 区 ° 接受
效 估 机会
出 予以 密 c 断 估 当
出 断 当
到 到控 具 史 具 ¶ 于
情况
当慎

» 及各器官 位
情况 【 ¼ 】 分 拮
分枝 ½
所 机会
出
也 ¾
孟 关 ‘
关 拮 合 巴 ¿ 白À 更
关; 因 推 合

Á大于
Â Ã 合
更大 以
•
• Ä š › 于 ;
• 机会 史;

- Ä到Å 1方 1方
1区Æ ° ；
- Å ¶ 因

——

接受 再 例
Ä接受 所出
Ç È 因
估 定 估 人
史 以É 人 接Ê史 以及ËÉ 当 所
所 ì查 O 影Í学 推 O
建 _î 放 根 及 分枝 异
g 斑点
g 吸 技术 建
史 ï Ð 处方 到 Ñ Ò
具 %
拮 显 以减少
再 估 否
; Ó Ô Õ 以 Ä Ö ×
Ø 接 否
定 估 Ù
一Ú 断 Û Ç 予以 Ü
...情况 必 Ý Þ 8 ß
à á 必 向具 咨
必 根 当¹ 建
当 â
于 具 个 显ã È 因 Œ ì查 具
史 ä å 定 £ æ

予 当 â Ç 取 â
仍出 再 例 一
功 , 出 建
专 会 以 ç è é 定 个 否 合
后 出 征
例 VW] ê 减 ' ~ * ë ì 建 Û Ç í
强 î 建 ï ' 断
Ò Ä 最 ð ñ Ä 密
切接 Ê 情况

后 密切 征
查 当
也 出 Ñ
出 于一名
出 密切 功 '
合 及 c 断 查 取 当
机会

接受 察到 内 机会
于 以 É 拮 未 € ò 当
会 命 后
出 流 ¹ 区 Æ ° ï
' 断 于出 ó 汗 VW
呼吸 T U ô õ ¾ 无 Ñ ö 克 征 ÷
á Û Ç ‰
断 查
当
具 ø 商
断 实 ù

出

因
功 , 癌 拮
拮
充分
人
拮 段 一于
拮 以 察到更
例 关 屑 关 强 柱
克 恩 斑块 屑 化 汗
人 段
基底 癌 率 例
信区
例 信区
位 均 个
人
巴 癌 最 察到
乳 癌 癌 列 癌 癌以及
段 型 根
ú 人口 â 情况 Á ' û
ü 关 强 柱 屑 克 恩
人 段
例 例 察到
位 均 个
人 放 y p f
段 例 位
个 ' 察到 例 分 ' y 内 癌 癌
率 信区
具 更 Ç 具 显吸 史 X L
及 格 拮 率更
比于 拮 率更

根 尚 “ 否 典型 癌
影响 所 $\tilde{A}$ 典型 癌 比
化 f 典型 癌 史
均 以及整个 定 典型 $\grave{i}$ 查 估内
容 根 当¹ 少 查
癌

段 癌
率 信区
信区
及 查所 否 $\grave{A}$,
史 史 屑
巴 白

所 拮 人 段 比于
拮 以 察到更 巴 例
人
段 例 例 巴 例
例 巴
人 位

例 察到 巴
率 比根 $\acute{u}$ 人口 $\hat{a}$
率 $\acute{A}$, $\hat{u}$ $\ddot{u}$ 大 倍
巴 率 拮 巴 率无 比— 无
 $\hat{a}$ 更 人 率 ζ 未 拮 情况
, 具 $\check{s}$ 于

比一 $\ddagger$ 人 巴 更 几倍
于 $\frac{3}{4}$ 关于² 白 后 例
拮 关 ζ 未 拮 也 比一 $\ddagger$ 人 更
倍 白
儿

接受 拮 儿 少 人
Á≤ Â 一 命 一
半 例 巴 巴 余 例 各
儿 少 关
位 个 个 后
接受 后 例来 于 料 i
ú 后
巴 一 型 巴
后 例 拮 例
例 克 恩
少 几乎所 断 断
接受 唑嘌 巯基嘌 合 拮 尚
定 否 拮 拮
关 慎 合 唑嘌 巯基嘌
敏反
后出 敏反
敏 反 敏反 Û Ç % 予 当
人 察到 敏 反 例 敏 疹
敏反 定 反 异 反 m n 疹
乙型 再
内 拮 乙型
带 Ç c 会 再 一 例 出
接受
也 促 再
拮 估具
先 于乙
建 咨 乙 关专业

% 后 几个 密 控 实 室征
出 再 % 当 取
效 再 控 后 拮 安 尚未
因 情况 , 慎 密切
_____反_____

内 拮 一 枢
例 影 í 学 化 关
化 7 以及 周 格林 巴 8 合征 以 É Å
ð 枢及 周 变 予
格 小@ 任何 %
枢 具 关
价 定 估 以
估 否 Å 否出 枢

名 关
型 敏反 ¥ 白 - 也 会 变
然 伤
拮 例 再 内 减
出 反 具
减少 例 小板减少 白 例
因 “ 出 征 例
~ 伤 白 Û Ç 异
Û

接
一
Ø 流 Ø
安慰 未 到 比例
- 保护 流 受

Ø Ø接 尚无 Ø 传
于 ÿ 内 Ä š › 于 儿 予 Ø 减 Ø 安
尚未 儿 接 慎 推 儿
亲妊娠 最后一次 后 个 内 儿接 Ø 例 Ö × Ø
Ø

充 @EFG

拮 后 充 @EFG
例 接受 也 充 @EFG 化 例
尚未 ; 然 一 拮
察到 关 反 率更 一
一 拮 察到 于充 @EFG所 率
& 于 @EFG 分 μ
当 ' 慎 密切 @EFG 【 忌切 关拼 断拮密密密拮密

手术

关于接受 手术安 划实
手术 到 具 — 半 F 接受
手术 密切关 情况 取 当 ù 接受
关 r 术安 也

小 BX

克 恩 无效 则 内 Å 定 Y Z 手术
会

人

接受 Å以 率
于 Å以 一 会出 命 后 因
, 关

作机器 E 影响

作机器 影响 接受 会引
头 = < = 7 0 劳 【 反 】 分
【 及 乳 】

具 E

建 具 当 方 妊娠
后 少 方 个

妊娠

大 大 例 于 例 —
例 š , 例 未 儿 r 率
一 列 ï 募 例 少 接受
关 克 恩 例未接受
主 点 大出 率 少出
一个 大出 率分 , 接受
未接受 未 ü
接受 未接
受 未 ü
合 ü 基 异 接受

未接受 次 点无 显 异 然
 流— 出 — 出 ý 机会 ; 未
 { 受到 方 学 u 小 机
 — 学 具
 尚无 幼 — 出 后
 因 因 妊娠 会 儿 反
 — 影响 妊娠 仅
 妊娠 接受 内 ” 儿 “
 从 儿 于 ý 内 š › 于 儿
 推 亲妊娠 最后一次 后 个 内 儿接
 Ø 例 Ö × Ø Ø

例 一 ž Ů
 定 亲 “ 带 以及出 儿 “
 最后一 于分 ™ ™ 天
 予 带 儿 “ 亲 “ 分’
 一个 例 所 例
 带 于 亲 “ d 一
 名 儿 “ 以 点分’ ™ 周 ™
 周 ™ 周 ™ 周 ý
 内 š › 儿 出 后 少 个 内仍 以 “ 到

乳
 来 文 信息 以 • ’ 乳 排
 人乳 Å “ 口
 ¥ 白 ¥ 白 { 8 — â 会影响接受 乳
 儿 儿 因 乳 以

E
 尚无 E 影响
 【儿 】
 尚未 估 儿 安 效
 【 】

【 】及【 事 】
【 互作 】

关 幼 关 屑 关 将
作 一 以及 合 作 比
— — ' 会 r
“ 减少 效 然 会 '
“ 率 &根 建 整

推 白À 合 【 事 】 分
推 巴 ¿ 合 【 事 】 分
接受8 后接受一 拮
察到更 率 关于

充£信息

推 拮 合
因 u 会 互作
——Ø

Ø 【 事 】 分

450 底

& 因 会
g 拮 因 分 会影响 g
底 ‰

建 效 林
个 以根 整

伍

于 伍 ¾ 合

【 】

察到 所 估 最大 次N J
大 推 倍 建 否出
反 征 出 ÛÇ 予 当

【 】

— 关 均 小 于 个 估 比 合

减 征 及 减 关 损 伤 效
方 每 两 周 周
主 点 以 及 次 点 周
到 反 分 比 主 点 周 到
反 分 比 具 一 个 主 点 周
变 € 判 断 一 个 主 点
变

AC 反

接受 到
反 分 比 保 一 总 每 两 周
安 慰 反 分 比

反	a		a		a	
	安 慰 c	b c	安 慰	b	安 慰 c	b c
个 个 个 个 个 个	d					
每 两 周 未	周	周	周	周		
	比 安 慰					

以及 值 均 周出 善 变
周 f 放 Š大 取 反
效 以保 名 名 每两
周 名 到 ；
名 到 名
名 每两周 名
到 ； 名 到 ； 名
到
反

显 $\tilde{a}$ 优于安慰

接受 到具 学
反 所 比安慰 周
从未接受 关
 $\check{z}$ $\check{z}$ 比 合
以 — 反 周 具 显 $\tilde{a}$ 反 周
反 保 定

反 分比

反				值 ^a	值 ^b	值 ^c
周 周 周 周 周						
合 比— 出 值 $\check{z}$ 合 比— 出 值 $\check{z}$ 比— 出 值 $\check{z}$ $\check{z}$						

™ 周 接受 合 到

{ 个关 分 小于 效 比
接受 ž 一比例 接受 ž
一比例 于 ð 断 关
合 学方 c 显 ā 优于
ž 以 关
到— 两 ž 效则
影 í 学
接受 均 关
放 学 查 方 关 损伤 估 出 总
分 ——

周 放 学 估 均分值变化

	信	信	信区	值 ^a	值 ^b	值 ^c
	区	区				

一周

一 @ 机 双盲 安慰 名
关 ã 受 接受
受 周 反
于安慰 效 价 主 ý 接受
受 周 反 于安慰
效 次 ý 以及 各 例
僵 关 健 估 以及 值 方
接受 受 盲
后 每 一周仍然 周 双盲 接受
盲后 周仍然保 u 率
也提 到 最初接受 一 u

强 柱

两 机 周 双盲 安慰 名 效
佳 强 柱 所 , 强 柱
均值 每两周 予
价 名 合 善
名 合 双盲 后 放
每两周接受 周 周
到 受 1 出 放 每两周
后作 双盲 学分 • 无反 接受
名 大 u 安慰 比 接受
显 强 柱 征 显 善 ™ 周 Ç 察到
显 ã 反 ™ 周

安慰

反 { 征

反	安慰	
a		
周		
周		
周		
周		
周		
周		

放	接受	每两周一次	周	双盲
段接受	受	盲后	率	
率	分 { 率	率 TM	周均	反
¥ 白	2	率均保	安慰	受
	率也提 到 最初接受	受	一 u	
接受	受	TM 周 强	柱	分
	总分	疼痛分	情	
分	lin			

安 效 ‘ ’ 名 分 ’ 接受 安慰
初 后 步 ™ 周 到最大
初 后每两周 以
次 后一周 周 比—
周 接受 ™ 周 周 到 少
则 一步 所 ’ 均基 值
整 估 ý 基 值Ü 从“ ” “ ” “
” “ ”
所 屑 ” 一 放 € 伸
少 接受 周
屑 主 点 ™ 周 到
比例
屑 周 效
安慰 每两周

安慰 “丧，充分” 以™ 周™ 周
分判断 基 比 善，于™ 周 比 分
少 分 只 “丧，
充分” 两 比— 机分 安慰 丧，
充分 € 后 ” 放 € 伸 接受
™ 周后 比例分，

屑 ‘ 名™ 周™ 周 到
完 周 *f* 放 接受
接受 周 总 ‘ 周 放 后 到
“ • 比例分， 将
因 事 乏 效 1 出 7 无 则
接受 周 ‘ 周 放 “ •
比例分，

一 放 € 伸 ‘ 名 定 ” 再 估
屑 推 位 “
” 更 个 € 出 反 无，
否 ” 再 名
接受 周后 到 “ •
未 比例分， 再

安 征

安慰 比
™ 周 —基 出 显 ã 善
安慰 比 @ 健 分值也出
显 ã 善
一 放 € 伸 于 ‘ 于 将
从每两周 每周 估 分，
周 周后 到

屑 名 斑块 屑 合 手 £

屑 比— 安慰 效 安 接受 周
次 后一周 每两周 安慰
TM 周 接受安慰 比 接受
手 £ 到 “ • 比例— 两 异 Å 学

屑 比 安慰 名 屑
效 安 接受初 然后每两周
予 次 后TM一周 安慰 周
后 接受 周 放 屑 估 屑
屑 整 估 屑
损 屑
均显

屑	TM 周	TM 周	TM 周 效
点	TM 周 安慰 安慰	TM 周 安慰 安慰	TM 周 放

每两 每两
周 周

一 @ 机 双盲 安慰 名 少一
光化学 效 佳 忌
受 人 斑块 屑 初
周 双盲 安慰 ” 按 比例 机分 接受每 一
周 安慰 所 , 均基
值 均基 值 整 估
ý 基 值Ü 从“ ” 受 “显 ã ” “
”
每 一周 ™ 周 到主 点 Ç
比例 显 ã 于安慰 于
次 点 ý 例 “ ’
以及 @ 健 分值 接受 到
比例显 ã 于接受安慰 将 放 接受
每 一周 ™ 周 放 段 先 双盲 接受
周内 定 Z 率 双盲 接受安慰
率 & 一

机 双盲 安慰
后 人 个 ,
安 效 估 按 次 然后每两周
次 后 周 方 接受安慰 允 定
一
估 例 接受
按 天 口 所 ” 接受
周 天 ý 化 后 强 步减
™ 周 完
估 例 控 情 基
按 天 口 后


强 步减少 TM 周 完
两 主 效 点 “出 . ´ ” 分 根
J 7 7 损 9 分 μ
分 μ 最佳 7 E 定 . ´
完 格 ” *f* 划
周 允 TM 周以后 接受 $\frac{3}{4}$ 们

两 接受安慰 比 接受
. ´ 具 学 两
比于安慰 . ´ 率 Å 及 久 影响 *a*
. ´


分 •		. ´	. ´ 位	^a	^a	值 ^b
TM 周 TM 周后 . ´ 主 分 •						
安慰						
TM 周 TM 周后 . ´ 主 分 •						
安慰						
			^c			

TM 周 TM 周后 TM 周后
. ´ 事 因 . ´ 以 因 1 出 1 出
查
安慰 于以 处 因 比例

双侧 值
估 处于 $\hat{s}$, 受 出 事 人 $\frac{1}{2}$
a 总 TM 周 TM 周后 TM 周 TM 周后



— 安慰 —



— 安慰 —

安慰 事 处于 $\hat{s}$, 人 ;
事 处于 $\hat{s}$, 人
于安慰 察到 . ' 每个 分均

异学 优于安慰 仅仅 察
到 7 E 异具 学 值 优势
€ 伸 段 位受 位受
合格 例 于 2 于 于 尿 7 变
于白内 手术 切 术引 从初步 效分 • 排
剩 位 位 价 完 周
放 y p 基于实 分 • 位 处于 N%
无 变 $\mu \leq$ $\mu \leq$ 合
 $\leq$; 位 处于 N%
TM 周 最佳 7 E 个 化 善 Z
比例 TM 周 后 大 一 后 ” 受
例 减少 总 ^ % 于 事 %
于 充分 %

两 7 E 关功
定 大 分 Å 值 优势 总 7 0 疼痛
đ 7 0 @ 健 总分 异均值具 学 ; 总 7
0 @ 健 异均值具 学 7 0 关 效 “
0 ” 值 8 于 ; 0 周 7 0 đ 7 0
值 8 于

一 机 双盲 @ 比—
® 斑块 屑 效 及安
例 Ě Ě 接受 少一 传 屑 敏
受 忌 . ’ 斑块 屑
_____ 例 ® 例 所 受 均接受_____ ®
次 周后 后每 周 周
主 点 TM 周 于基 善 分比
次 点 个 7 点 分比 变化情况

主 点“™ 周 于基 善 分比” 分• 无·
® 善率均 ®
分’ 比—两
效 异 两 效 值 均处于 â 先 定 ý
以 斑块 屑 效 效于
®

¾ 次 效 ý 估 两 反 率
于基 善 分比 到“ 几乎“ 受 比例 —基 变
化均未显 出 学 异 效 当
【 】
作

以 异 合 X断 c
受 互作 从] 学功
以 × 控 学效 变 白
到 作 分 半

殖 ^ —
到 周 每 只 È 9
【 ! E学】

后 天 到 “ 三 后 吸 ㄣ 分
Š 8 均 以 Ü
N J 后 呈 依 后 “
Ü 从 小 分 容 & 均]
半F 大 周 几例 关 关 “
每两周 后 关 均 分

‘ 未 合 合 “
 每两周 以及每周
 比例
 人 屑 每两周接受
 均
 于 ™ 周 予 然后 每两周 予
 ™ 周 均 大
 一 位 关 受 ！ E学
 估 ！ E学 征 次
 后 天 到 “ 均 分 ’ “ Ü
 分 ’ 小 小 分 容 分 ’
 均] 半F 分 ’ 周 周
 E学分 • 来 于 名 关 势
 “ 率& 具 定 合 — ’
 “
 儿 功
 一 健 受 机 双盲 ！ E学
 估 ！ E学 征 所 受 均接受 次
 例 例 主 0-t max
 ！ E学 分 • 显 0-t max 几何 整均值分
 ， 0-t max 几何 整均值分
 ， 0-t max 几何
 整均值比值 信区 分 ’
 均处于 定 效 值区 内
 具 ！ E学 效
 ！ E学 显 次 后 两
 位

$$t \quad \text{术均值分} \quad 0\text{-inf} \quad \text{术均值分}$$

“ 率 术均值分 ”

小 分 容 术均值分'



【 册人 - 企业名 】

【 - 后 务 位 所】

¶ 区

号三

位